

Um exemplo do tráfico e das apreensões acidentais no sertão de Pernambuco: as aves depositadas no CEMAFANA – CAATINGA

Mota, L. S.^{1,4}; Sampaio, D. S.⁴; Silva, F. B.^{2,4}; Nascimento, R.^{3,4}; Kaminski, N.⁴; Pereira, L. C. M.^{3,4}; Nicola, P. A.^{3,4}

¹ Colegiado de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Petrolina – PE.

² Colegiado de Zootecnia, UNIVASF, Petrolina – PE.

³ Colegiado de Ciências Biológicas, UNIVASF, Petrolina – PE.

⁴ Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga (CEMAFANA-CAATINGA), UNIVASF, Petrolina – PE.

E-mail: cemafaunacaatinga@hotmail.com

O comércio de animais silvestres capturados na natureza sempre foi uma atividade deletéria para a fauna. Particularmente o tráfico de aves silvestres, tem sido um importante redutor da densidade populacional de algumas espécies. O CEMAFANA - CAATINGA é um centro de conservação e manejo de animais silvestres, localizado em Petrolina-PE, que recebe animais oriundos do Projeto de Integração do Rio São Francisco e animais apreendidos por órgãos ambientais. Objetivando avaliar a avifauna utilizada para o tráfico ou captura acidental na região do Vale do São Francisco foi elaborado um inventário das espécies de aves depositadas no CEMAFANA no período de Março de 2009 a Abril de 2012. Foram depositados 1374 indivíduos referentes a 87 espécies, distribuídas em 17 ordens: Passeriformes (839); Psittaciformes (431); Columbiformes (31); Strigiformes (27); Acciptriformes (8); Falconiformes (9); Cariamiformes (4); Piciformes (4); Pelecaniformes (3); Caprimulgiformes (2); Galbuliformes (2); Gruiformes (2); Cathartiformes (3); Apodiformes (1); Ciconiiformes (1); Galliformes (1) e Podicipediformes (1). Observou-se que as ordens de Passeriformes e Psittaciformes foram as mais apreendidas. Para estas duas ordens, as espécies com maior número de apreensões foram: *Aratinga cactorum*, *Paroaria dominicana*, *Cyanoloxia brissonii* e *Amazona aestiva*. Algumas espécies possuem áreas de distribuição diferentes do bioma local, tais como *Jabiru mycteria*, *Alipiopsitta xanthops*, *Ramphastos toco*, provavelmente provenientes do Cerrado e *Procnias nudicollis* e *Pyroderus scutatus*, da Floresta Atlântica. Duas espécies são exóticas: *Melopsittacus undulatus* (periquito australiano) e *Sreptopelia decaocta* (pomba de coleira). Os dados avaliados indicam a preferência dos infratores por determinadas ordens, por se tratarem de aves canoras ou de fácil domesticação. Levantamentos dessa natureza fornecem subsídios para o desenvolvimento de ações voltadas à educação ambiental e conscientização da população.

Financiamento: Ministério da Integração Nacional